

แมลงวันทองในผลไม้

รูปร่างลักษณะ :

เป็นแมลงขนาดเล็ก ส่วนหัว ออก และท้องมีสีน้ำตาลอ่อน ที่ด้านหลังตรงส่วนอกมีแถบสีเหลืองทอง ไกล่ๆ กับโคนปีกทั้งสองข้าง



การป้องกันกำจัด:

1. เก็บผลที่ถูกแมลงวันทองทำลายมาเผาทำลาย ขุดหลุมฝัง หรือนำน้ำหมักชีวภาพ

2. การห่อผลไม้ เป็นการป้องกันการเข้าไปวางไข่ในผลไม้ที่ง่ายและได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่งอีกทั้งยังเป็นวิธีการที่ปลอดภัยจากการใช้สารฆ่าแมลง

3. การใช้สารล่อแมลงวันทอง

- การใช้เมธิลยูจินอล เป็นสารล่อแมลงวันทองตัวผู้ อัตราการใช้เมธิลยูจินอล 4 ส่วน ผสมมาลาไซออน 83% EC 1 ส่วน หยดลงบนก้อนสำลี 3 - 5 หยด นำไปแขวนในกับดัก จากนั้นนำกับดักไปแขวนในทรงพุ่มสูงประมาณ 1.5 เมตร
- การใช้เหยื่อโปรตีน สามารถดึงดูดได้ทั้งแมลงวันทองเพศผู้และเพศเมีย โดยใช้เหยื่อโปรตีนออกโตไลเนสหรือไฮโดรไลเซท อัตรา 200 มิลลิลิตร ผสมสารฆ่าแมลงมาลาไซออน 57% หรือ 83% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 5 ลิตร พ่นเป็นจุดๆ ต้นละ 4 จุด พ่นต้นเว้นต้น ทุก 7 วัน และพ่นในเวลาเช้าตรู่ ซึ่งเป็นช่วงที่แมลงวันทองออกมาหาอาหาร เริ่มพ่นครั้งแรก หลังห่อผลเสร็จ 1 สัปดาห์และพ่นต่อเนื่อง จนเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ

ลักษณะการทำลาย :

แมลงวันทองจะวางไข่ในผลไม้ ในช่วงผลใกล้สุก จนถึงผลสุก ทำให้ลายในมีหนอนเข้าทำลาย ส่งผลให้ผลเน่าและร่วงหล่นในที่สุด



งานส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายอำนวยการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลริมปิง
โทรศัพท์ 053-500984
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.rimping.go.th